

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVALUATION CLINIQUE ASSOCIÉES À LA CONCORDANCE DIAGNOSTIQUE ENTRE UN PHYSIOTHÉRAPEUTE ET DES MÉDECINS CHEZ DES PATIENTS AVEC DOULEUR AU GENOU

Bass A¹, Décary S², Dyer JO¹, Desmeules F^{1,3}

¹École de réadaptation, Faculté de médecine, Université de Montréal,

²Centre de recherche sur les soins et les services de premières lignes de l'Université Laval,

³Centre de recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

INTRODUCTION

- Les **erreurs diagnostiques** peuvent mener à une **prise-en-charge tardive et inadéquate**.
- Il est couramment accepté que **certaines caractéristiques de l'évaluation clinique** (CEC), comme celles reliées à l'anamnèse ou à l'examen physique, **peuvent nuire à la validité diagnostique**.
- ⚠ Toutefois, **ces caractéristiques n'ont pas été formellement identifiées dans la littérature**.

OBJECTIF PRINCIPAL

- Déterminer si certaines CEC peuvent influencer la concordance diagnostique entre un physiothérapeute (PHT) et des médecins spécialistes des troubles musculosquelettiques (médecins du sport et orthopédistes, MD) chez des patients souffrants de douleur au genou.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

